

<https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusohjelma-lapsille-ja-aikuisille>

# Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ovat maksuttomia. Ne annetaan neuvolassa, kouluterveydenhuollossa tai omalla terveysasemalla.

## Sivun sisältö

- [Lasten rokotukset](#)
- [Aikuisten rokotukset](#)
- [Rokotusohjelma ikävuosittain](#)
- [Riskiryhmiin kuuluvien rokotukset](#)

## Lasten rokotukset

Suomessa kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus 13:a eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan (taulukko).

Jokainen rokotus annetaan sellaisessa iässä, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri oikeaan aikaan.

Lisätietoa pikkulasten rokotuksista:

[Neuvolaikäisen rokotusopas \(pdf 2,8 Mt\)](#)

## Aikuisten rokotukset

Aikuisten tulee itse huolehtia siitä, että ovat saaneet perussarjana vähintään kolme jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotusta.

Lapsuus- ja nuoruusiässä annettuja jäykkäkouristus-, kurkkumätä-, ja hinkuyskärökoituksia tehostetaan aikuisiässä (taulukko). Poliorokotetta ei normaalisti tarvitse tehostaa perussarjan saaneella aikuisella. Tehostetta suositellaan vain riskimaihin lähteville tai sieltä saapuville.

Jokaisella aikuisella tulee olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Aikuisen MPR-rokotussuoja täydennetään, jos se on puutteellinen.

# Rokotusohjelma ikävuosittain

## Taulukko. Lasten ja aikuisten rokotusohjelma

| Ikä           | Tauti, jolta rokote suojaa   | Rokote                       |
|---------------|--|------------------------------|
| 2 kk          | Rotavirusripuli  | Rotavirus                    |
| 3 kk          | Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus  | Pneumokokkikonjugaatti (PCV) |
| 3 kk          | Rotavirusripuli  | Rotavirus                    |
| 3 kk          | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)  |
| 5 kk          | Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus  | Pneumokokkikonjugaatti (PCV) |
| 5 kk          | Rotavirusripuli  | Rotavirus                    |
| 5 kk          | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)  |
| 12 kk         | Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus  | Pneumokokkikonjugaatti (PCV) |
| 12 kk         | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)  |
| 12-18 kk<br>* | Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko   | MPR                          |
| 6 kk<br>- 6 v | Influenssa (vuosittain)  | Influenssa                   |

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 1,5-11 v   | Vesirokko   | Vesirokko **           |
| 4 v        | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio   | Nelosrokote (DTaP-IPV) |
| 6 v        | Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko   | MPRV                   |
| 6 tai 12 v | Vesirokko   | Vesirokko ***          |
| 10-12 v    | Ihmisen papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä, kuten kohdunkaulan syöpä, emättimen, ulkosynnyttimien, peräaukon, peniksen sekä pään ja kaulan alueen syöpiä | HPV                    |
| 14 - 15 v  | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä  | dtap-tehoste           |
| 25 v       | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä  | dtap-tehoste           |
| 45 v       | Kurkkumätä, jäykkäkouristus   | dT-tehoste             |
| 65 v       | Kurkkumätä, jäykkäkouristus (tämän jälkeen 10 vuoden välein)  | dT-tehoste             |
| 65 v       | Influenssa (vuosittain)   | Influenssa             |

\* THL suosittelee, että MPR-rokotteen ensimmäinen annos annetaan 12 kk iässä

\*\* lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa

\*\*\* Vesirokkorokote-sivun ohjeiden mukaisesti

## Riskiryhmiin kuuluvien rokotukset

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan perusrokotussuojan lisäksi riskiryhmiin kuuluville tarjotaan heille räätälöityä rokotussuojaa tiettyjä sairauksia vastaan.

Myös nämä rokotukset kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan ja ovat saajalleen maksuttomia.

### BCG-rokotukset

BCG- eli tuberkuloosirokotetta tarjotaan vain niille alle 7-vuotiaille lapsille, joilla on THL:n määrittelemien rokotusaiheiden mukaisesti lisääntynyt vaara saada tuberkuloosi.

[BCG-rokote](#)

## **Pneumokokkirokotukset**

Alle 5-vuotiaat tiettyihin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat lapset voivat saada PCV-pneumokokkirokotteen lisäksi PPV-rokotteen ilmaiseksi kansallisen rokotusohjelman osana.

Ilmisiin PPV-rokotuksiin ovat oikeutettuja lapset, joilla on sairautensa vuoksi erityisen suuri riski saada vakava pneumokokkitauti tai siihen liittyvä jälkitauti.

[Pneumokokkirokotteet](#)

## **Influenssarokotukset**

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

[Influenssarokote](#)

## **Puutiaisivotulehdusrokotukset**

Kansallisen ohjelman puutiaisivotulehdus- eli TBE-rokotteisiin ovat oikeutettuja 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka asuvat vakituisesti tai kesäasunnossa sellaisilla alueilla, joissa puutiaisivotulehduksen ilmaantuvuus on suuri.

[TBE-rokote eli "punkkirokote"](#)

## **Hepatiittirokotukset**

Henkilö, jolla elinolosuhteidensa vuoksi on lisääntynyt vaara saada hepatiitti A- tai hepatiitti B -tartunta, on oikeutettu hepatiittirokotuksiin THL:n määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti.

[Hepatiitti A -rokote](#)

[Hepatiitti B -rokote](#)

[Hepatiitti A- ja B -yhdistelmärokote](#)

## **Kantasolusiirteiden saaneiden rokottaminen**

Kantasolusiirron jälkeen potilaat ovat tavanomaista alttiimpia monille rokotuksin ehkäistävillä taudeilla. Tämän vuoksi heidän rokotussuojansa pitää rakentaa uudestaan.

Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat kantasolujen siirron saaneille maksuttomia. Lisäksi heille suositellaan tiettyjä muita rokotuksia.

[Kantasolusiirteiden saaneiden rokottaminen](#)

## **Meningokokkirokotukset**

Meningokokki ACWY ja meningokokki B -rokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta 1.8.2020 alkaen THL:n määrittämiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

[Meningokokkirokotteet](#)

*Päivitetty: 1.11.2021*